

術前中止薬のチェックリスト

- ・これは手術や麻酔に影響がある薬やサプリメントのリストです。中止しない場合、麻酔がききにくい、血腫や血栓などの合併症が起こりやすい、あざや腫れが目立ちやすいなどの可能性があります。
- ・リストに含まれている薬を確認し、定められた期間中止してください。
- ・病院で処方された薬は**必ず処方した医師に確認してから中止してください**。該当するかわからない場合はかかりつけ医にこのリストを見せてください。

★裏面もご確認ください

		一般名	商品名	期間
抗凝固薬	☐	ワルファリン	ワーファリン、ワーリン	3～5日（血液検査が必要）
	☐	ダビガトランエテキシラート	ブラザキサ	1～2日
	☐	リバーロキサバン	イグザレルト	1日
	☐	アピキサバン	エリキュース	1～2日
	☐	エドキサバン	リクシアナ	1日
抗血小板薬	☐	アスピリン	バイアスピリン、パファリン、ゼンアスピリン、アスファネート、ニトギス、タケルダ、ファモスター、パッサミンなど	7日
	☐	チクロピジン	パナルジン、ソロゾリン、パチュナ、パナビジン、マイトジン、ファルロジンなど	10～14日
	☐	クロピドグレル	ブラビックス	14日
	☐	プラスグレル	エフィエント	14日
	☐	イコサペント酸エチル	エパデール、アテロパン、エパキャップソフト、エパラ、メタパス、エメラドール、エパフィール、エパロース、クレスエパ、ソルラミンなど	7日
	☐	オメガー3脂肪酸エチル	ロトリガ	7日
	☐	シロスタゾール	プレタール、ファンテゾール、シロシナミン、ファンテゾールなど	3日
	☐	サルポグレラート	アンブラーグ	1～2日
	☐	ジラゼブ	コメリアンコーワ、スルドルミンなど	3日
	☐	トラピジル	ロコルナール、カルナコールなど	2日
	☐	ジビリダモール	ベルサンチン、トーモル、シノフス、サンベル、ベルチスタンなど	1日
	☐	ベラプロストナトリウム	プロサイリン、ドルナー、プロルナー、プロスタリンなど	1日
骨粗しょう症治療剤	☐	ラロキシフェン	エビスタ、ラロキシフェン	3日（全身麻酔のみ）
	☐	バゼトキシフェン	ビビアント	3日（全身麻酔のみ）
女性ホルモン（ピル）	☐	卵胞ホルモン	プレマリン、ヒスロンHなど	4週（全身麻酔のみ）
	☐	卵胞・黄体ホルモン	プラノバル、フリウエル、ルナベル、ヤーズ、マーベロン、シンフェーズ、アンジュ、オーソ、トリキュラーなど	4週（全身麻酔のみ）
減酒薬	☐	ナルメフェン塩酸塩	セリンクロ	1週（全身麻酔のみ）

- ・これは手術や麻酔に影響がある薬やサプリメントのリストです。中止しない場合、麻酔がききにくい、血腫や血栓などの合併症が起こりやすい、あざや腫れが目立ちやすいなどの可能性があります。
- ・リストに含まれている薬を確認し、定められた期間中止してください。
- ・病院で処方された薬は**必ず処方した医師に確認してから中止してください**。該当するかわからない場合はかかりつけ医にこのリストを見せてください。

★裏面もご確認ください

	一般名	商品名	期間
サプリメント	☐ イチョウ葉エキス		1日
	☐ セントジョーンズワート (セイヨウオトギリソウ)		5日
	☐ EPA/DHA		3～4日
	☐ レスベラトロール		※
	☐ ガーリック (ニンニク)		7日
	☐ 朝鮮人参		7日
	☐ ジンジャー (生姜)		7日
	☐ カバ		1日
	☐ エフェドラ		1日
	☐ フィーバーフュー		7日
	☐ バレリアン		※
	☐ エキナケア		※
	☐ ノコギリヤシ		※
	☐ アロエ		※
	☐ アルファルファ		※
	☐ クロレラ		
	☐ 青汁 (ケール)		
	☐ クマザサ		
	☐ ウコン		※
	☐ カモミール		
	☐ ナットーキナーゼ		※
	☐ パパイヤ		
	☐ コエンザイムQ10		※
	☐ パッションフラワー		
	☐ セイヨウエビラハギ (メリロート)		※

※中止期間に関する情報がない成分です。手術を決めた時点で中止することをおすすめします。